

L'ACTIVITE ORNITHOLOGIQUE EN 1970 EN VALAIS

par Jean-Claude Praz, Sion

Le groupe des jeunes observateurs du collège de Sion est de plus en plus important et, en plus d'une activité d'information et d'occupation de loisir, ces jeunes organisent régulièrement des randonnées sur le terrain pour observer la faune. Les lignes qui suivent sont un rapport très résumé des résultats de ce travail poursuivi avec ardeur tout au long de l'année. Les personnes qui conseillent et soutiennent cet effort méritent nos remerciements les plus sincères ; ce sont surtout M. C. Bottani pour les directives et les déplacements en voiture, M. M. Deléglise pour la mise sur pied d'activités au Musée cantonal d'histoire naturelle et au Vivarium du collège, la Ligue valaisanne pour la protection de la nature, par son président, M. W. Kraft, pour l'appui financier. Nos plus vifs remerciements vont aussi au président de la Bourgeoisie de Sion, M. B. de Torrenté qui, par son intervention, a permis la conservation, pendant cette année encore, de la « Gouille au Milouin », gravière où nichent de nombreux oiseaux intéressants comme le martin-pêcheur, le canard colvert, la poule d'eau, la foulque et où les migrateurs trouvent un refuge pour quelques jours et une nourriture abondante. Divers observateurs m'ont enfin communiqué leurs notes prises en Valais ; entre autres M. U. Glutz von Blotzheim, professeur à l'Université de Berne qui est venu en excursion avec ses étudiants entre Sierre et Agarn. Les illustrations accompagnant le texte sont l'œuvre de François Deléglise, dessinateur du groupe ; en plus de nos encouragements, il a droit à nos remerciements pour avoir mis les clichés à notre disposition. Voici, dans l'ordre, les observations les plus importantes.

Un Grèbe huppé **Podiceps cristatus** a séjourné du 26 février au 16 avril à la gravière de Granges, un deuxième individu s'est arrêté en avril aux Iles de Sion et les 15 et 18 mars, ce magnifique oiseau était observé sur le Rhône, à Fully et Riddes respectivement. C'est la première fois que le plus grand de nos grèbes se montre si régulièrement dans le Valais central. Comme chaque année, le Héron cendré **Ardéa cinerea** apparut plusieurs fois chez nous mais, à mi-octobre, ce n'est pas moins de 10 individus qui ont été vus en vol, au-dessus de Chamoson, nombre assez inhabituel pour la région. L'apparition des différentes espèces de hérons nous offre chaque année de beaux spectacles ; cette année, 5 Aigrettes garzettes **Egretta garzetta** se sont laissées admirer tout à loisir les 8 et 10 mai à Agarn par des observateurs plus nombreux qu'elles

et le Héron bihoreau **Nycticorax nycticorax** a été observé deux fois au printemps (à Grône et Sion) et une fois en juillet (2 le 18 à Grône).

Les Cygnes **Cygnus olor**, après un hivernage réussi grâce à la nourriture régulièrement apportée, ont tenté une installation définitive mais le couple disparut à la fin avril ; la pauvreté de la gouille de Poutafontane et des gravières artificielles en plantes aquatiques est probablement la cause de cet abandon. Deux Canards chipeaux **Anas strepera** ont trouvé à Agarn et aux Iles de Sion des lieux favorables puisqu'ils y ont séjourné respectivement du 24 mars au 6 juin et du 3 au 19 avril. D'autres canards ont été observés, entre autres un mâle de Pilet **Anas acuta** le 24 mars à Poutafontane, et deux couples de Souchets **A. clypeata** le 21 mars à Ardon ; un couple d'oiseaux de cette espèce séjourna jusqu'au 11 avril aux Iles de Sion. Parmi les plongeurs, le Milouin **Aythya ferina** a été observé le plus souvent ; 1 mâle les 29 janvier et 8 février à Grône, 1 couple du 13 au 28 mars aux Iles de Sion et deux individus le 13 septembre au même endroit. Le Morillon **Aythya fuligula** a également été noté à la fin de l'hiver : un mâle le 21 janvier à Grône et le 25 à Sion, ainsi que les 19 et 29 mars aux Iles. Beaucoup plus rare est le Milouinan **Aythya marila** le long du Rhône : une femelle se tenait le 2 janvier à Massongex. Enfin une première observation pour le Valais central faite l'année passée: le 27 novembre 1969, une femelle de Garrot à œil d'or **Bucephala clangula** s'est arrêtée sur le Rhône à Sion.



Cygnes

Le baguement des rapaces en hiver par C. Bottani commence à porter ses fruits; nous avons une première donnée sur l'origine des Buses hivernant en Valais; un individu bagué le 19 février 1969 a été retrouvé en juin 1970 à Jenaz (Grisons).

A la Porte-du-Scex, un Milan noir **Milvus migrans** occupa cette année un site de nid assez exceptionnel puisqu'il l'a construit dans la paroi de rochers, sous un surplomb. Un Busard indéterminé **Circus sp.** chassait le 11 janvier dans les vergers d'Ardon. Alors que le Busard des roseaux **C. aeruginosus** est observé presque chaque printemps, le Busard cendré **C. pyrgus** ne l'est qu'occasionnellement: un mâle, probablement subadulte a pu être déterminé dans de très bonnes conditions le 2 mai par C. Bottani et le 10 par U. Glutz von Blotzheim à Agarn. Deux Faucons kobez **Falco verpertinus** chassaient le 18 mai à Agarn également. Cette localité est un lieu de prédilection pour cet oiseau pourtant peu commun en Suisse; c'est la troisième année que nous l'y observons.

Chaque année, des dizaines de Faisans **Phasianus colchicus** sont lâchés dans la plaine du Rhône. Ces oiseaux élevés en captivité sont mal préparés à survivre dans la nature et ceux qui restent après la période de chasse disparaissent normalement au cours de l'hiver, à part une petite population d'oiseaux sédentaires et nicheurs qui subsistent dans les endroits favorables. Pourtant un individu a été tué par une voiture ce printemps dans les Mayens de My (Conthey), à 1400 m. d'altitude, une année après le lâcher. Cet oiseau s'est probablement retiré sur le coteau en hiver, lorsque la plaine était recouverte de neige.

Un Grand gravelot **Charadrius hiaticula** s'est arrêté le 8 septembre à Grône. Si le Pluvier guignard **Eudromias morinellus** traverse régulièrement les Alpes, il n'est pas facile de le rencontrer; c'est par hasard qu'un individu s'envola devant moi le 12 septembre, à 2400 mètres, au-dessous du Mont Carré, à Hérémence. La Bécasse des bois, **Scolopax rusticola** est un oiseau difficile à voir et on peut se demander si les observations de cette année ne sont dues qu'à l'augmentation du nombre des observateurs; le 13 janvier, un individu s'est tué à l'orphelinat de Sion; il se trouve actuellement au Musée cantonal. Ce printemps je levai deux individus le 11 avril dans les vergers de Sion et quelques jours plus tard un oiseau de cette espèce s'envola précipitamment devant moi à Savièse. Enfin à Finges, RP. Bille observa un couple dans la partie Est de la forêt et suivit le développement d'un nid dans la partie Ouest; l'éclosion des 4 œufs eut lieu le 30 avril. U. Clutz entendit la croule dans cette même forêt le 8 mai. Le Chevalier gambette **Tringa totanus** a été noté le 30

avril et en migration nocturne le 3 octobre aux Iles de Sion, le Chevalier aboyeur **Tringa nebularia** le 19 avril au même endroit. Près des Gouilles d'Hérémence, non loin du lieu d'observation du pluvier guignard, le 12 septembre également, se tenait un Chevalier arlequin **Tringa erythropus**.

Du 13 au 21 décembre 1969, des Mouettes rieuses **Larus ridibundus** nous ont rendu visite, se tenant principalement sur le Rhône, à Sion, près du pont de la route de Bramois, comme elles l'avaient fait en 1967. Le 20, elles étaient 35 et avec elles se tenait un Goéland cendré **Larus canus**; c'est la première fois que cette espèce est observée en amont du Léman. En plus des quelques petits groupes habituels de Mouettes rieuses, un vol de 45 est observé le 19 mars à Sion et Riddes, se dirigeant vers l'Ouest. En compagnie de Guifettes noires **Chlidonias niger**, une guifette leucoptère **C. leucopterus** s'est arrêtée le 8 mai à Agarn (Carlo Bottani).



Guifette noire venant de capturer un vairon

Le 3 avril, une cinquantaine de Pigeons conlombins **Colomba oenas** se tenait dans les prés de Agarn. Cette année, des Tourterelles des bois **Streptopelia turtur** ont à nouveau chanté en amont de Finges: 4 ind. le 8 mai à Agarn, 1 chanteur le 28 mai à Gampel; sont-elles encore en migration ? Un contrôle systématique des vergers de pommiers «Canada» de Bramois mené spécialement par B. Michellod a permis de trouver une population inattendue de rapaces nocturnes; trois couples de Chouettes chevêche **Athene noctua** et autant de Hiboux moyen-duc **Asio otus** plus un ou deux couples de Hiboux petit-duc **Otus scops** habitent dans un triangle délimité par le Rhône, la Borgne jusqu'à Bramois et la route qui relie ce village à Grône. Deux nids de la première espèce et trois de la deuxième ont pu être suivi du début de la ponte à l'envol des jeunes. Sachant que ces oiseaux se nourrissent essentiellement de petits mammifères (Campagnols, Mulots), on peut se faire une idée de leur utilité et déplorer la disparition de ces vergers dans la plaine du Rhône, disparition qui amène également celle des rapaces nocturnes. Une Chouette chevêchette **Glaucidium passerinum** est entendue le 10 mai par U. Glutz von Blotzheim et les étudiants de l'Université de Berne entre Varone et Rumeling, à l'altitude de 1050 mètres environs; c'est une des altitudes les plus basses où cette chouette a été entendue en Valais.

Un couple de Martin-pêcheur **Alcedo atthis** a élevé deux nichées dans les Iles de Sion grâce à l'intervention de Mr. de Torrenté qui a permis la conservation du site de nidification. Un Guêpier **Merops apiaster** passa au-dessus du marais de Saint-Pierre-deClages le 3 juillet se dirigeant vers l'Est. M. Glutz et les étudiants eurent la chance de pouvoir observer, le 10 mai, dans des conditions très favorables et pendant plus de 10 minutes un magnifique Rollier **Coracias garrulus** dans la région de Varren Salquenen; l'oiseau s'envola ensuite vers l'ouest. Le début de l'hiver 1969/1970 très ensoleillé favorisa l'hivernage de certaines espèces d'ordinaire peu communes chez nous, entre autres, quelques Alouettes lules **Lullula arborea** observées le 3 janvier sur les pentes de Maladières (Sion).

Les Bergeronnettes printanières **Motacilla flava** s'arrêtent chaque année en nombre dans notre région; plusieurs races géographiques sont connues pour cette espèce mais certaines d'entre elles nécessitent des observations dans de très bonnes conditions et beaucoup de patience pour être déterminées avec certitude. Le 10 mai, à Agarn, M. Glutz parvint à déterminer une Bergeronnette printanière à tête noire **M. f. feldegg**; cet oiseau nichant habituellement au sud-est de l'Europe a récemment été trouvé nicheur au Tessin (A. Schifferli, der ornithologische Beobachter,

No 65) et est noté pour la première fois en Valais. Rappelons que la sous-espèce nichant en Valais est celle à tête cendrée **M. f. cinereocapilla**, et que le seul endroit connu est Agarn. La Pie-grièche à tête rousse **Lanius senator** est un oiseau qui passe volontiers inaperçu si on ne lui prête pas une attention spéciale. Des recherches systématiques ont permis à P. A. Oggier de recenser six couples nicheurs dans la plaine du Rhône, sur le territoire des communes de Riddes et Chamoson.



La Borgne
Le 5. Novembre 1976
F.D.

Cincla s'ebrouant

L'évènement le plus important de la saison a été l'installation massive des Grives litornes **Turdus pilaris** dans la plaine du Valais central. Après la découverte d'un premier nid à Vissigen-Sion, F. Catzeflis garda une surveillance constante sur la région. Le nombre de nids occupés s'élevait à 21 en juin et la nidification se prolongea jusqu'en juillet. Des nids ou des oiseaux nicheurs ont également été trouvés à Ardon, Chamoson, Riddes, Bramois et Mund. Cette espèce niche dans le val d'Illiez et des observations ont été faites dans le Bas-Valais (Muraz), dans la vallée de Conches et le val d'Hérens. Cet oiseau s'est installé, à Sion, dans des plan-

tations de pommiers et poiriers, nichant le plus souvent à la fourche de l'arbre, à moins de 3 mètres du sol. Un mâle de Fauvette à tête noire **Sylvia atricapilla** en hivernage est noté le 11 janvier à Uvrier.

Huit Rémiz pendulines **Remiz pendulinus** parcouraient les roseaux de Montorge le 25 octobre. L'installation de filets par C. Bottani permit la capture et le baguage de deux individus ainsi que le contrôle d'une Mésange bleue **Parus caeruleus** portant une bague française. Alors que jusqu'à maintenant seuls deux chanteurs de Bruant proyer **Emberiza calandra** étaient entendus à Agarn, cette année a vu l'augmentation brusque de la population puisque 7-8 chanteurs pouvaient être entendus en juin; toutefois certains individus étaient peut-être des jeunes d'une première nichée précoce. Pour la première fois cet hiver, des Bruants zizis **Emberiza cirrus** ont été observés en hiver en Valais; huit ind. se tenaient les 10 et 11 janvier sur un terrain vague à Châteauneuf. Des Tarins **Carduelis spinus** ont niché aux Mayens de Riddes cette année où deux couples au moins ont élevé des jeunes. Le nombre de Sizerins **Carduelis flammea** a augmenté en ville de Sion; R. Hainard signale des bandes nombreuses au nord de la ville en juin et juillet et note la présence de familles (Nos Oiseaux, No 331). L'installation dans le quartier des Creusets eut lieu le 8 mai; en 1969, ils y avaient été noté pour la première fois le 11 mai; ces dates correspondent-elles à l'arrivée des nicheurs dans les forêts alpines? Bien que cela soit probable, il serait intéressant d'étudier les relations pouvant exister entre ces oiseaux de plaine et ceux occupant leur biotope normal, en montagne. Le nombre de Venturons **Carduelis citrinella** étaient également assez élevé cet hiver. Ils ont spécialement hiverné à Maladères, Tourbillon, par groupes d'une dizaine d'individus. Alors qu'il est coutume de parcourir de nombreux kilomètres pour observer des oiseaux, il arrive aussi que le contraire se produise; c'est ainsi qu'à Monthey, le 20 décembre 1969, quatre Durbecs des sapins **Pinicola enucleator** rendirent visite à M. R. Voisin qui put les observer tout à loisir; c'est une des premières données sûres pour cette espèce arctique en Suisse. Les Gros-becs **Coccothraustes coccothraustes** étaient également plus nombreux cet hiver, spécialement dans la région de Sion, en ville et sur le côteau; en plus, nous en avons noté 6 le 25 janvier à Euseigne, 1 les 5 et 6 janvier à Haute-Nendaz et Lens.

Les observations de Crave à bec rouge **Pyrrhcorax pyrrhcorax** sont rares au nord des Alpes en hiver; deux individus ont séjourné à Sion (Valère) du 27 décembre 1969 au 4 janvier 1970; malgré la présence de nombreux Chocards **Pyrrhcorax graculus** dans les environs, nous ne les avons jamais vus se mêler à leurs groupes.